

# CONSIGNES SANITAIRES CONSULTATION D'OSTÉOPATHIE EN PÉRIODE DE COVID-19



## ARRIVEZ À L'HEURE PRÉCISE DU RDV :

*Ni en avance ni en retard. Ne sonnez pas et ne frappez pas à la porte, votre praticien arrive dans quelques instants vous ouvrir. L'accès à la salle d'attente et aux toilettes ne sera pas disponible.*



## LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE AVANT ET DURANT TOUTE LA DURÉE DE LA SÉANCE :

*Porté depuis moins de 2 heures de préférence.*



## RESPECTEZ LES DISTANCES AVEC VOTRE PRATICIEN EN DEHORS DE L'ACTE DE SOIN.



## NE PORTEZ PAS DE GANTS ET ÉVITEZ LES CONTACTS AUTANT QUE POSSIBLE



## LAVEZ-VOUS LES MAINS EN ENTRANT ET EN SORTANT DU CABINET :

*Une solution hydro-alcoolique sera proposée*




## UN SEUL ACCOMPAGNANT :

*Uniquement pour les mineurs. Les autres patients doivent venir seuls*


# SIGNALEZ TOUTE PRESENCE DE SYMPTOME DE COVID-19 A VOTRE PRATICIEN

## LES INFORMATIONS ESSENTIELLES SUR LE COVID-19

### Quels sont les signes ?



### Comment se transmet-il ?



- 1 Face à face pendant au moins 15 minutes
- 2 Par la projection de gouttelettes

## STOP CORONAVIRUS

Les gestes pour se protéger et protéger les autres



Se laver très régulièrement les mains



Tousser ou éternuer dans son coude



Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter



Se tenir à au moins 1 m des autres voyageurs



Saluer sans serrer la main et éviter les embrassades

# SI VOUS PRÉSENTEZ UN OU PLUSIEURS FACTEURS DE RISQUE MERCI DE CONTACTER VOTRE PRATICIEN AVANT LE RDV

assurance-maladie.fr

**#Coronavirus #Covid19**

## Quels sont les critères de risque ?

Les critères définis par arrêté de la Haute Autorité de Santé sont les suivants :

- Femmes enceintes
- Maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique...)
- Insuffisances respiratoires chroniques
- Mucoviscidose
- Insuffisances cardiaques toutes causes
- Maladies des coronaires
- Antécédents d'accident vasculaire cérébral
- Hypertension artérielle
- Insuffisance rénale chronique dialysée
- Diabètes de type 1 insulino-dépendant et diabète de type 2
- Les personnes avec une immunodépression :
  - pathologies cancéreuses et hématologiques, transplantations d'organe et de cellules souches hématopoïétiques
  - maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur,
  - personnes infectées par le VIH
- Maladie hépatique chronique avec cirrhose
- Obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.